

第②類医薬品

鎮咳きよ痰剤

新リココテ[®]錠

効能又は効果 せき、たん

用法及び用量 大人(15歳以上) 1回 3錠
12歳以上15歳未満 1回 2錠
1日3回なるべく空腹時を避けて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。
*(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(3)12歳未満の小児は服用しないこと。





切り口

成分及び分量
(9錠中)

ジヒドロコデインリン酸塩……………	30mg	dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩……………	50mg
シプロフィリン……………	100mg	グアヤコールスルホン酸カリウム……………	270mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………	12mg	キキョウ末……………	300mg
ケイヒ末……………	150mg		

添加物:乳糖、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、セルロース、サッカリンNa、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、ℓ-メントール

⚠《使用上の注意》

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。(1)12歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい(眠気等があらわれることがあります)。
4. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
5. 過量服用・長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難(6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**保管及び
取り扱い上の
注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発売元 **ゼネール** 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネール** 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地