

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

せきとたんによつた効き目の

## ゼリス液Ⅱ

本剤は2種類の生薬〔キキョウ（桔梗）、オウヒ（桜皮）〕をはじめ、咳を鎮めるジヒドロコデインリン酸塩、気管支拡張作用を有するdl-メチルエフェドリン塩酸塩を配合した服用しやすい液剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください  
15才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱
- (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果**      せき、たん

### 用法・用量

成人（15歳以上）1回10mLを1日3回食後に服用します。更に就寝前に1回服用してもよいです。必要な場合1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

**成分・分量**      （1日量・60mL中）

成分	分量	はたらき
キキョウ流エキス （原薬換算量 2g）	2mL	喉の痛みをやわらげます。また、気道粘膜の分泌を促し、たんを出しやすくします。
オウヒエキス （原薬換算量 2g）	80mg	
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳中枢に働き、咳を鎮めます。
d1-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	末梢神経に働き気管支を拡張し、息苦しさを緩和します。

添加物として、白糖、クエン酸、安息香酸 Na、パラベン、アルコール、プロピレングリコール、香料を含有します。

### 〔成分・分量に関連する注意〕

本品は生薬成分を配合していますので沈殿を生じることがありますが、効力に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 服用後はビンの口を拭いてからフタを十分にしてください。
- (5) 計量カップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願い申し上げます。

大生堂薬品工業株式会社    お客様相談室

電話：058-271-9481      受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元

**合名会社 東宝製薬**  
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

製造販売元

**大生堂薬品工業株式会社**  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号