

せき、たん



**セキドメ**『タイヨ』

クエン酸チペピジン主剤

第2類医薬品



太陽堂製薬株式会社

**セキドメ**『タイヨ』

第2類医薬品

● せき、たん

● せき、たん

## 成分及び分量 1日量(9錠)中

クエン酸チペピジン	60mg
d-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg

なお、添加物として以下のものを含む。

乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロースNa、黄色5号、赤色3号

## 効能又は効果

せき、たん。

## 用法及び用量

15才以上 1回……3錠・11才以上15才未満 1回……2錠

8才以上11才未満 1回……1錠

何れも1日3回白湯又は清水にて服用。

小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 注意

1. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 使用に際しては、添付文書をよく読むこと。

副作用被害救済制度：0120-149-931 12錠 ¥400+(税)

配置期限

製造販売元

太陽堂製薬株式会社

奈良県高市郡高取町下土佐578

電話 0744-52-2174(土日祝除く9時~5時まで)



セキドメ<sup>®</sup> タイヨ-

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# セキドメタイヨー

**第②類  
医薬品**

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある)
4. 8才未満の乳幼小児には服用させないこと。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
    - (1) 医師の治療を受けている人。
    - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
    - (3) 授乳中の人。
    - (4) 高齢者。
    - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
    - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
    - (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- 裏面もお読みください

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさがあらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止しこの文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限経過後は服用しないこと。