

日本薬局方 カンゾウ
販売名：カンゾウ ダイコー
内容量：500g

袋表ラベル



袋：PE, PP

第2類医薬品 日本薬局方 刻

カンゾウ

【用法及び用量】
大人（15歳以上）は1日量5gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
激しい咳、咽喉痛の緩解

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 500g

Lot.





4 987716 121556

製造販売元
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬株式会社


袋裏ラベル

3


使用上の注意

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること 

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人……むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人…高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。