

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## せき止め薬 ペリコンWエース

第②類医薬品

- ペリコンWエースは、せきの中枢にはたらいでせきの発作をおさえ、気管支を広げてせきをしずめます。またアレルギー性のせきや、たんを伴うせきにも優れた効果をあらわします。
- ペリコンWエースは、苦味をおさえたのみやすいシロップ剤で、不快なせきやたんを早くおさえます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
12歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 過量服用・長期連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果**

せき、たん

**用法・用量**

年 齢	1 回 量
15歳以上	10mL
12歳以上15歳未満	6mL
12歳未満	服用しないこと

通常1日3回食後に服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。(添付の計量カップをご使用ください。)

**<用法及び用量に関連する注意>**

- 用法・用量を厳守すること。
  - 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

**成分・分量**

60mL(15歳以上の1日最大服用量)中

成 分	分量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢にはたらいで、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	気管支を広げて、せきをおさえ呼吸を楽にします。
ノスカピン塩酸塩水和物	45mg	気管支平滑筋をゆるめてせきをしずめます。
ジプロフィン	120mg	気管支を広げて、せきをしずめます。
クロルフェニミンマレイン酸塩	12mg	のどの炎症をおさえます。
無水カフェイン	75mg	抗ヒスタミン剤による眠気をおさえます。
グアイフェネシン	225mg	分泌液を高めてたんを出しやすくします。
セネガ流エキス	0.9mL	粘膜からの分泌液を高め、たんを出しやすくします。

添加物：白糖、サッカリンNa、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、黒糖フレーバー、エチルバニリン、香料

**保管及び取扱い上の注意**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 服用のつど、瓶の口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかり閉めること。
- 本剤に添加されている甘味成分がキャップに付着しやすいため、キャップが開かなくなる場合がある。このような場合は一度キャップ部をお湯に浸してから開けるようにすること。
- 目盛り付きカップは、使用のつど水洗い等して常に清潔に保管すること。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに服用すること。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



**中外医薬生産株式会社**

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

03BWETCEO