

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

セキトマル（鎮咳去痰薬）[第②類医薬品]

抗アレルギー作用をもつ生薬を含み、中枢性と末梢性の鎮咳剤をバランスよく配合した「せき止め」です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

4. 過量服用・長期連用をしないでください。

5. 1才未満の小児。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人。

(4) 高齢者。

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。

(6) 次の症状のある人。／高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。／心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(必ず裏面もお読みください)

症状の名称	症 状
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれます。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれます。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 便秘、口のかわき、眠気
- 5 ~ 6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】せき・たん

【用法・用量】

年 齢	1回量
成 人 (15才以上)	1包
12才以上 15才未満	2/3包

以上いずれも1日3回食後水又は温湯にて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

<用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもと服用させてください。

【成分・分量】1日量3包中（1包量1g）中

成 分	作 用	分 量
リン酸ジヒドロコデイン	中枢性鎮咳作用	30mg
dl-塩酸メチルエフェドリン	気管支拡張作用	75mg
ノスカビン	中枢性鎮咳作用	60mg
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン作用	12mg
無水カフェイン	眠気防止作用	60mg
カンソウ末	鎮咳・去痰作用	300mg
オウゴン末	抗アレルギー作用	300mg
グアヤコールスルホン酸K	去痰作用	270mg
添加物：炭酸Mg、リン酸水素Ca、パレイショデンブン		

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社島伊兵衛薬品 お客様より相談室

☎ 076-421-3530 月曜～金曜日 9:00～17:00 (祝日除く)