



日本薬局方 カンゾウ末  
ナカジマ カンゾウ末

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。)  
短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 次の症状のある人：むくみ
  - (5) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。  
症状の名称：偽アルドステロン症・ミオバチー  
症状：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ徐々に強くなる。
3. 5～6回服用しても症状が良くならない場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

激しい咳、咽頭痛の緩解

用法及び用量

大人（15歳以上）は1回0.5gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ②小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- ④本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 075-231-2633

副作用被害救済制度 0120-149-931