

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

# ニッドせきどめB液プラス

ニッドせきどめB液プラスは、せき、たんの症状緩和にすぐれた効果をあらわします。

## 特 長

- ・「ノスカピン塩酸塩水和物」「ジヒドロコデインリン酸塩」がせき中枢に働き、せきを鎮めます。
- ・せきどめ効果のある「キキョウ」「セネガ」「バクモンドウ」といった3種類の生薬を配合しています。
- ・苦味と甘味を特長とするシロップ剤で、12才以上の方に服用いただけます。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい  
12才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
5. 過量服用・長期連用しないで下さい

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6)次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
便秘、口のかわき、眠気

(裏面もお読み下さい。)

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 効能・効果

せき、たん。

## 用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により、1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として、4時間の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1回量	備 考
15才以上	10mL	添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計って下さい。
12才以上15才未満	6mL	
12才未満		服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成分・分量

成 分	1日量(60mL)中	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき、くしゃみの緩和
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	せき、くしゃみの緩和
ノスカピン塩酸塩水和物	60mg	せき、たんの緩和
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻水の緩和
無水カフェイン	150mg	眠気防止
キョウ流エキス(キョウとして1,000mg)	1.0mL	せき、たんの緩和
セネガ流エキス(セネガとして1,000mg)	1.0mL	たんの緩和
バウモンドウ流エキス(バウモンドウとして1,200mg)	1.2mL	せきの緩和

添加物としてクエン酸、プロピレングリコール、安息香酸Na、パラベン、香料、白糖、エリスリトール、スクラロース、カラメル、ポビドン含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)びんの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5)使用期限はケース底面及びラベルに記載されています。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (7)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社

TEL 0748-62-4163

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

# 日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62