

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

アネトリンせき止め液

アネトリンせき止め液は、鎮咳薬のコデインリン酸塩水和物、気管支拡張薬のdl-メチルエフェドリン塩酸塩、抗ヒスタミン薬のクロルフェニラミンマレイン酸塩に加え、鎮咳去痰作用のある生薬、セネガを配合しておりますので「せき」「たん」にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
12才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
5. 過量服用・長期連用しないで下さい

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- 6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

せき、たん。

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により、1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として、4時間の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1 回 量	備 考
15才以上	10.0mL	添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計って下さい。
12才以上15才未満	6.5mL	
12才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

成 分	1 日 量 (60mL) 中	働 き
コデインリン酸塩水和物	50mg	せき、たんの緩和
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	せき、たんの緩和
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻水の緩和
無水カフェイン	60mg	眠気防止
セネガ流エキス(セネガとして1.5g)	1.5mL	たんの緩和

添加物としてクエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)びんの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5)使用期限はケース底面及びラベルに記載されています。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (7)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社
TEL 0748-62-4163
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62