

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに
セキポンS

第②類医薬品

セキポンSは、咳中枢に働きて咳を鎮めるジヒドロコデインリン酸塩、気管支を拡げ咳を鎮めるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、鼻水・鼻づまり・くしゃみ・のどの不快感を取り除くクロルフェニラミンマレイン酸塩、気道粘膜を潤し痰を切りやすくして咳を鎮める麦門冬乾燥エキス等を配合した服用しやすい鎮咳去痰薬で、せき・たんに効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

- 1.12才未満の小児は服用しないでください
- 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、鎮静薬
- 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 5.過量服用・長期連用しないでください



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 肤 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌 尿 器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気

4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の量を1日3回食後、水又は白湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 |
|------------|-------------|
| 成人(15歳以上) | 1包 |
| 12歳以上15歳未満 | 2/3包 |
| 12歳未満 | 服用しないでください。 |

【用法・用量に関する注意】

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1日量(3包)中

| 成 分 | 分 量 | は た ら き |
|----------------------|-------------------|--|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 30mg | せき中枢に働いて、せきをしめる働きがあります。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | 気管支をひろげ、せきをしめる働きがあります。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg | 鼻水・鼻づまり・くしゃみ・のどの不快感を取りのぞく働きがあります。 |
| 無 水 カ フ ェ イ ン | 150mg | 気管支をひろげ、せきをしめる働きがあります。また、眠気を取る働きがあります。 |
| 麦門冬乾燥エキス (麦門冬として) | 200mg (1000mg) | 気道粘膜をうるおし、たんを切りやすくして、せきをしめる働きがあります。 |

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、合成ケイ酸Al、乳糖水和物、色素(黄色5号)を含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】



(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

美吉野製薬株式会社 「お客様相談係」

電話 (0745)67-0144(代) 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話 : 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元



美吉野製薬株式会社

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩 692

2002SA