

**第②類
医薬品**

セキドXP 顆粒K 鎮咳去痰薬

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、果物味い薬、アレルギー用薬等）
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。（眠気があらわれることがある。）
 - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
 - 過量服用・長期服用しないこと。

▣ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしがちがある人。(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状 | 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------|-------|------|
| 皮膚 | 発赤・発赤、かゆみ | 精神神経系 | めまい |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|---------|
| 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 | 再生不良性貧血 |
| 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 | 無顆粒球症 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便秘、口のかわき、眠気

- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 1包を分割した残りは、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用すること。
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

2包入 (1包1g) ₪ 250+税

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



配製期限

登録

商標

**第②類
医薬品**

セキドXP 顆粒K

鎮咳去痰薬



**效能又は効果
せき・たん
用法及び用量**

大人 (15歳以上) 1回……1包
8歳以上 15歳未満 1回……1/2包
3歳以上 8歳未満 1回……1/4包
3歳未満は服用しないこと。
1日3回服用する。

但し服用間隔は4時間以上おくこと。

(用法及び用量に関する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分及び分量 1日量(3包) 中

| | |
|---|---------|
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 30mg |
| di-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg |
| ショウキョウ末 | 135mg |
| 無水カフェイン | 150mg |
| キヨウ末 | 1,500mg |
| 添加物としてケイヒ末、ヒドロキシプロビルセルロース、グリチルリチン酸二カリウム、リン酸水素カルシウム、バレイショデンプン、香料を含有する。 | |

製造販売元 大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西町 632-1 お問い合わせ先 ☎ 0744-27-3325