

せき・たんじ



# セキドナP顆粒K

第②類医薬品



ジヒドロコティンリン酸塩  
dl-メチルエフェドリン塩酸塩配合

発売元



近畿医薬品製造株式会社  
奈良県高市郡高取町清水谷714  
TEL 0744-52-2022(代)

6包入

第②類医薬品

セキドナP顆粒K

せき・たんじ

せき・たんにはセキドナP顆粒K 第②類医薬品

# せき・たんにはセキドナP顆粒K 第②類医薬品

効能又は効果

せき、たん。

用法及び用量

大人(15歳以上)1回……………1包  
8歳以上15歳未満1回……………1/2包  
3歳以上8歳未満1回……………1/4包  
1日3回服用する。但し服用間隔は4時間以上おくこと。

成分及び分量1日量(3包)中

ジヒドロコデインリン酸塩……………30mg  
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………75mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………12mg  
ショウキョウ末……………135mg  
無水カフェイン……………150mg  
キキョウ末……………1,500mg  
添加物としてケイヒ末、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸二カリウム、リン酸水素カルシウム、バレシヨテンブ、香料を含有する

注意

- (1)服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- (4)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (5)配置期限経過後は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

6包入(1包1g) ¥750+税



配置期限

製造販売元 大和合同製薬株式会社 奈良県橿原市川西町632-1

あける

第②類医薬品

せき・たんにはセキドナP顆粒K

せき・たんにはセキドナP顆粒K

第②類医薬品

## ◆鎮咳去痰薬 ⚠️ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 1) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 2) 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある。)
- 3) 授乳中の方は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けること。4) 過量服用・長期連用しないこと。

## 🗨️ 相談すること

- 1) 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3) 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

便秘、口のかわき、眠気

4) 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りは、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。