

第②類医薬品 **せき・たん**

☆セキドメP 顆粒K☆

せき・たん

効能又は効果

大人(15歳以上)	1回	1包
8歳以上15歳未満	1回	1/2包
3歳以上8歳未満	1回	1/4包

1日3回服用する。但し服用間隔は4時間以上おくこと。

成分及び分量 1日量(3包)中

シヒドロコデインリン酸塩	30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg
ショウキョウ末	135mg
無水カフェイン	150mg
キキョウ末	1,500mg

添加物としてクイヒ末、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸二カリウム、リン酸水素カルシウム、パレシヨデンプ、香料を含有する。

【注 意】

- (1)服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)服用に際して添付文書をよく読むこと。
- (4)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
- (5)配置期限経過後は服用しないこと。

2包入(1包1g) ¥ 250.



配置期限

製造販売元 大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西街632-1

☎0744-27-3325

副作用被害救済制度 ☎01201491931

せきに



第②類医薬品

セキドメP 顆粒K

コデイン主剤

たん



発売元

株式会社西川栄寿堂

奈良県高市郡高取町清水谷1025

◆鎮咳去痰薬 ⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 1) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 2) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある。)
- 3) 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
- 4) 過量服用・長期連用しないこと。

👤 相談すること

- 1) 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3) 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

便秘、口のかわき、眠気

4) 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りは、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。