

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

せき・たんに

鎮咳去痰薬

コフチンW液

生薬配合ーカンゾウエキス・セネガエキス

- コフチンW液は、せきをしずめ、たんをきる生薬のカンゾウエキスとセネガエキスを配合した鎮咳去痰薬です。
- 6つの成分のはたらきで、せき・たんの症状をやわらげます。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

1. 次の人は服用しないでください

12才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください


5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

成分・分量 30mL中

はたらき	成分	分量
せき中枢に働き、せきをしずめます	ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます	<i>d</i> l-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
抗ヒスタミン作用により、せきをしずめます	クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg
中枢に作用して、他の成分の働きを助けます	無水カフェイン	75mg
生薬成分がせきをしずめ、たんをきります	カンゾウエキス	625mg (原生薬換算量 2,500mg)
	セネガエキス	60mg (原生薬換算量 600mg)

添加物:安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、白糖、カラメル

<成分・分量に関連する注意>

生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

用法・用量


添付の計量カップで次の量をはかり、1日3回毎食後および必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては1日6回まで服用しても差し支えありませんが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔を置いて服用してください。

年齢	15才以上	12～14才	12才未満
1回量	5.0mL	2.5mL	服用しないでください
服用回数	1日3回		

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 少量をはかる場合は、下図のように計量カップを斜めの線が水平になるようにかたむけて使用してください。
- (4) 服用のつどキャップを閉める前にビンの口を清潔なガーゼ等でふいてください。(まれに糖分が固まってキャップが開けにくくなることがあります。) また、閉め方が悪いと内容液がもれ出したり汚染されることがあります。
- (5) キャップが開けにくいときは、お湯が中に入らないように注意しながら、キャップの部分をお湯(50～60℃)に2～3分浸してから開けてください。
- (6) 計量カップはご使用のつど、水洗い等して常に清潔に保管してください。

【少量のはかり方】



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓してビンを立てた状態で保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2