

日本薬局方  
カンゾウ

第2類医薬品

《用法及び用量》

大人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

《効能又は効果》

激しい咳、咽喉痛の緩解



4 993512 110236

LOT 702006

500g

〇切

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

# ⚠ 使用上の注意

## してはいけないこと❌

1. 次の人は服用しないでください。
  - ・生後3カ月未満の乳児
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

## 相談すること👤

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 次の症状のある人      むくみ
  - (5) 次の診断を受けた人      高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

□ 保管及び取扱い上の注意 □

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。



株式会社 小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643



PET, PE