

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

第3類医薬品

翔龍散ストレートP

翔龍散ストレートPは、のどのあれ・不快感をやわらげ、いつでもどこでも、水なしで服用できる顆粒タイプのお薬です。6種類の生薬成分が患部に直接作用して、のどにうるおいを与えます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 高熱
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


効能・効果

たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感

裏面もよくご覧ください

用法・用量

次の量を1日6回、水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。
3歳未満の小児は服用しないでください。



<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

成人1日量6包（4.2g中）

成 分	分 量
キョウ末	84.0mg
セネガ末	4.2mg
カンゾウ末	102.0mg
キョウニン末	15.0mg
ニンジン末	84.0mg
アセニャク末	8.4mg

添加物：エリスリトール、バレイシヨテンブン、クエン酸、メタケイ酸アルミン酸Mg、*l*-メントール、タルク、無水ケイ酸、赤色102号、香料、*dl*- α -トコフェロール、プロピレングリコール、エタノール、グリセリン


<保管及び取扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

<お問い合わせ先>

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い致します
株式会社サイキョウ・ファーマ お客様相談窓口（受付・平日 10:00～16:00）

☎0120-456-787 www.saikyo-pharma.co.jp

 発売元
株式会社サイキョウ・ファーマ
東京都江東区亀戸5丁目6番21号

製造販売元
株式会社パナケイア製薬
富山県高岡市中田4576番地 OJJ-***A