

服用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

ナナ顆粒

せきどめ「タイフ」

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

12歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)

4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

5. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼 吸 抑 制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気

4.5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

せき,たん

用法・用量

年齢区分	15歳以上	12歳以上15歳未満	12歳未満
1回量	1包	2 / 3包	服用しないこと

上記1回量を1日3回食後に服用してください。

◎用法及び用量に関する注意

- (1)定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)12歳未満の小児には、服用させないこと。

成分・分量

本品1日量(3包中) 1包量1g

成分	分量
キキョウエキス	125mg(原生薬500mgに相当する)
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg

添加物として乳糖水和物, D-マンニトール, 無水ケイ酸, サッカリンNa水和物, 香料を含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる.)

◎消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所在地 / 富山県富山市水橋二杉1-2

T E L / 076(478)5171

受付日時 / 月~金曜日 AM10:00~PM 3:00(祝祭日を除く)

製造販売元



大和製薬株式会社

富山県富山市水橋二杉1-2