

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに……

アネトン[®] せき止めZ液

〈鎮咳去痰薬〉

第②類医薬品



90820

アネトンせき止めZ液は、いろいろな原因で起こる“せき”をしのぎ“たん”的れをよくします。
また、さわやかなレモンティー風味の液剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 乳児（乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック（アナフィラキシー）があらわれたとの報告があります。）。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

年齢により次の量を服用してください。

年 齡	1 回 量	1 日 服 用 回 数	
成 人 (15歳以上)	10mL	3回	症状により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。
11歳以上 15歳未満	6.5mL		
8歳以上 11歳未満	5mL		
5歳以上 8歳未満	3.3mL		
3歳以上 5歳未満	2.5mL		
1歳以上 3歳未満	2mL		
3ヶ月以上 1歳未満	1mL		
3ヶ月未満			服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

アネトンせき止めZ液は淡褐色透明の液剤で、成人1日量(60mL)中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとあります。

成 分	分 量	は た ら き
コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン)	50mg	せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしづめます。
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	のどにからまるたんを溶解して、出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。
セネカ流エキス	1500mg	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうそくし、出しやすくします。


添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

**【包装】**

アネトンせき止めZ液：100mL



計量カップ付
開封の際、お捨てにならないようご注意ください。

<1回の服用量>

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 「お客様相談室」 フリーダイヤル 0120-567-087

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売元

武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号