

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。

鎮咳去痰薬
ルルのど飴TG

第2類医薬品

24粒
[4粒×6スティック]

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人：高熱
 - (7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 (12粒中)

DL-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 180mg、セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg

添加物：イソマル、グリセリン脂肪酸エステル、アセツルファムK、ステビア抽出物、クエン酸、L-メントール、香料、エタノール、プロピレングリコール、赤色106号、青色1号

用法・用量

成人 (15歳以上) 及び 11歳以上	1回2粒	1日5～6回 口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用して下さい。
5歳以上11歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5歳未満		服用しないで下さい。

(用法・用量に関連する注意) (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

効能・効果
のどの炎症によるのどの痛み、
のどのはれ・のどののれ、のどの
不快感・声がれ、せき、たん、
腫痛 (ゼーゼー、ヒューヒュー) を
とまなうせき

使用期限
製造番号

Antitussives and Expectorants



製品情報
Product Info



グレープ味



第一三共ヘルスケア

24粒



くらしリズム
MEDICAL
by TACHIBANA GROUP

せき、のどの痛みに
ルル[®]のど飴TG
せき・たんに効く2つの成分+殺菌成分

[ノンシュガー]

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒110-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
お薬情報相談室 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祭日を除く)
企画元
株式会社ツルハルファーマー・チャイナ・イン・ヤン

製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10

MADE IN JAPAN



01 (8) 登録商標 4