

第3類医薬品 南天のど飴U(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。必要なときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意[してはいけないこと](守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)[相談すること] 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください3.5~6回服用しても症状がよくならない

関係部位		症	状
皮	iČi	発疹・発売	元 かゆみ
消化	器	吐き気・嘔	吐、食欲不振
精神神経系		めまい	

場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください **効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・

のどのはれ 用法・用量 食間に服用してください。右表の1回量を1錠

ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	
8才以上15才未満	2錠	30
5才以上8才未満	1錠	276256
5才未満	服用しないでください。	

成分・分量 1日量(9錠)中 南天実乾燥エキ ス…500mg 添加物:白糖、水 アメ、ハチミツ、ク

エン酸、I-メントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カ ルナウバロウ、香料(エタノール)

保管および取扱い上の注意(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後は袋の口を折り曲げて、保管してください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

常盤薬品工業株式会社 大阪市中央区安土町3-5-12 NOEVIR GROUP 南天のど飴のブランドサイトはこちら

http://nodoame.jp

1錠あたり7kcal

067452 TISB401

お問い合わせは 常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室0120-875-710まで 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 0120-149-931