

## 第3類医薬品 南天実エキス配合

### 常盤のど飴（せき止め薬）

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

「常盤のど飴」は、古くからせきやのどのあれなどに効果のある煎じ薬として用いられていた「南天」の実を有効成分としたドロップタイプのせき止め薬です。せき、のどのあれに効果をあらわします。

#### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）  
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）



#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。 高熱
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 効能・効果

せき、のどの炎症による声がれ・のどの  
あれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

### 用法・用量

食前に服用してください。下表の1回量を1錠ずつ口中に含み、かまず  
にゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔を  
おいて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成分・分量

1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス……500mg 添加物：黒砂糖、白糖、水アメ、トメントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後はフタをしめてください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。(配置期限は缶の側面に記載)

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

0120-149-931

常盤薬品工業株式会社  
NOEVIR GROUP

本社

神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元

三重県伊賀市白檉字永谷2604-5

TISI805

1