

つらいせき、
のどの痛みにも効く

第3類医薬品

南天のど飴

南天実エキス配合

G

せき止め

のどあれ

声がれ

はちみつぶどう風味



常盤薬品
NOEVIR GROUP

第3類医薬品

✂ ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

南天のど飴G(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意[してはいけないこと](守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など) [相談すること] 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

効能・効果 せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ 用法・用量 食間に服用してください。左表の1回量を1錠ずつ口中に含み、かまずに

ゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス500mg 添加物：白糖、水アメ、ハチミツ、クエン酸、l-メントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、香料(エタノール、

プロピレングリコール) 保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1錠あたり7kcal

常盤薬品工業株式会社

NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

南天のど飴のブランドサイトはこちら

<https://nodoame.jp>

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室0120-875-710まで

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931

067497

TISI803

①