

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

せき・たん・ぜんそくに
コフトローチ

特徴：コフトローチはせきやぜんそくに効果がある成分と口中殺菌成分が含まれています。かまわずに口の中で溶かしていること、薬効成分が溶け出し、口中の粘膜に直接的にあるいは粘膜より吸収されて局所的に効果を現し、せき、たん、ぜんそくを鎮める働きがあります。

- ◎d1-メチルエフェドリン塩酸塩
せき及びぜんそく性のせきのせきどめとして効果を発揮します。
- ◎セチルピリジニウム塩化物水和物
口中殺菌作用があり、口中を清潔に保ち、のどの炎症によるのどののはれや痛みを防ぎます。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱
 - (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

せき、ぜんそく及びたん。
のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどののはれ。

【用法・用量】

大人(15歳以上)…………… 1日6錠
15歳未満…………… 服用しないでください
1回1錠、2時間以上の服用間隔をおき、口の中でかまわずにできるだけゆっくりとかして用いてください。

【用法・用量に関連する注意】

1. 本剤はトローチ剤です。かみ砕いたり、そのまま飲み込んだりしないでください。
2. 小児には服用させないでください。
3. トローチ剤の取り出し方
右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります)



【成分・分量】 1日量(6錠)中

d1-メチルエフェドリン塩酸塩…………… 37.5mg
セチルピリジニウム塩化物水和物…………… 6mg
賦形剤 キキョウ末
賦形剤 セネガ末


添加物として白糖、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、l-メントール、香料、プロピレングリコール及び黄色5号を含有する。

【成分に関する注意】

成分中のキキョウ末、セネガ末により錠剤の表面に黒～褐色の細かい斑点を認めることがあります。品質に変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)



【お問い合わせ】

寧薬化学工業株式会社
相談窓口 ☎ 0745-22-4151
9:00～16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2番25号