

せき止め トローチ

爽やかな抹茶味



▶せき・たん・のどの痛みに

(実物大)

鎮咳成分 + 去痰成分

鎮咳成分 (フェノールフタリン酸デキストロメトルファン)

1日最大量 90mg 配合

第2類医薬品

コデミンGトローチプラス 18錠

【効能・効果】せき、たん、のどの炎症による声がれのどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【成分・分量】6錠(1錠1.1g)中

セチルジニウム塩化物水和物6mg、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン90mg、グアヤコールソルホン酸カリウム140mg
添加物：粉末還元麦芽糖水アム、精製白糖、胃酸カリウム、アラビアゴム末、セラチン、軽質無水ケイ酸、パラオキシ安息香酸ブチル、銅クローフィリンナトリウム、ステアリン酸カリウム、香料

使用期限

製造番号



副作用被害救済制度
☎0120-149-931

第2類医薬品

コデミンGトローチプラス

使用に際しては、説明書きをよくお読みください。



△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬等)

■相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の高重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5〜6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法・用量】

次の回量を口中に含み、かまわずにゆっくり溶かしてください。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人 (15歳以上)	1錠	6回	2時間以上
11歳以上 15歳未満		4回	4時間以上
8歳以上 11歳未満	3回		
8歳未満	使用しないでください		

<用法・用量に関連する注意>

- 1.用法・用量を厳守してください。2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。3.本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。4.トローチ剤の取り出し方 下図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



PTPシート取り出し図

【保管及び取扱い上の注意】1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.子どもの手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となる可能性があります。)4.本品は水に溶かして服用してください。5.賞味期限切れの製品は服用しないでください。6.賞味期限切れの製品は服用しないでください。7.賞味期限切れの製品は服用しないでください。8.賞味期限切れの製品は服用しないでください。9.賞味期限切れの製品は服用しないでください。10.賞味期限切れの製品は服用しないでください。

【保通薬赤司】日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田増軒80-1
お電話相談室 ☎0120-415-688
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



開封口