

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。



第2類医薬品

鎮咳去痰薬

新エスベナントローチ

咽・喉頭炎などは、過労、睡眠不足、栄養不良などで抵抗力が弱っているときに口や鼻から侵入した細菌が原因となって起こる炎症です。また、炎症が起きると、たんが生じ、それに伴ってせきが出るようになります。

新エスベナントローチは、炎症を起こす原因となる細菌を殺して、のどのはれ・痛みを抑えるセチルピリジニウム塩化物水和物をはじめ、せきやたんを鎮めるノスカピン、グアヤコールスルホン酸カリウムを配合したトローチ剤で、口中で徐々に溶かすと、口腔咽喉内に拡散し、長時間作用をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

せき、たん

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

■ 用法・用量

次の量を口中に含み、かまわずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
11歳以上	1錠	2時間以上の間隔を置いて6回
8歳以上11歳未満	1錠	4時間以上の間隔を置いて4回
5歳以上8歳未満	1錠	4時間以上の間隔を置いて3回
5歳未満	服用しないこと	

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

(4) 本剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



裏面の注意事項もよくお読みください。

■成分・分量〔6錠（11歳以上の人の1日服用量）中〕

ノスカピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40mg
ゲアヤコールスルホン酸カリウム・・・・・・・・ 140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物・・・・・・・・ 6mg
添加物として白糖、ブドウ糖、グリチルリチン酸2K、アセスルファムカリウム、
ヒドロキシプロピルセルロース、銅クロロフィリンNa、ステアリン酸Mg、香料、
バニリン、エチルバニリン、L-メントールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、開封後は使用期限内であってもなるべく早くご服用ください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

発売元 **白石薬品株式会社**

〒567-0005 大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**

〒529-1642 滋賀県蒲生郡日野町上野田119番地