

⚠ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれかの医薬品も使用しないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬等）

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。（1）医師の治療を受けている人。（2）妊娠又は妊娠していると思われる人。（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（4）次の症状のある人。高熱 **2.** 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ・息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔用法・用量〕

次の1回量を、口中に含み、かまことにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)		6回	2時間以上
11歳以上15歳未満	1錠	4回	4時間以上
8歳以上11歳未満		3回	
5歳以上 8歳未満			
5歳未満の乳幼児	使用しないでください。		

〔用法・用量に関する注意〕

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤はトロー子剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- 本剤は、5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
- トロー子剤の取り出し方
右図のようにトロー子剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）

PTPシートの取り出し図

