

のどの殺菌・消毒、 口臭の除去に

第3類医薬品

ケンエー うがい薬

ポビドンヨード製剤

600mL



ケンエーうがい薬

第3類医薬品

ケンエーうがい薬は、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ●口内のひどいだれのある人 ●甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法用量】

1回、本剤2～4mL(2～4回押した分)を水約60mLに薄めて、1日数回うがいしてください

【用法用量に関連する注意】

●用法用量を厳守してください ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください ●うがい用のみ使用してください ●使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください

【使用法】

●キャップ①を固定し、ノズル②を矢印の方向に回すと、ポンプが上がります ●液が出るまで数回押してください ●ひと押しで約1mLの液が出ます ●一般に使われているコップに水を1/3満たせば、約60mLです ●長期間使用しないときは、ポンプを押し込んで時計回りに回して締めてください

【成分分量】 100mL中

ポビドンヨード7.0g
(有効ヨウ素700mg) 含有
添加物：エタノール、1-メントール、サッカリンNa水和物、プロピレングリコール、香料

【成分分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります

【保管及び取扱い上の注意】

●直射日光の当たらない涼しい所に保管してください ●小児の手の届かない所に保管してください ●他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) ●衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号、使用期限は
容器底面に記載



ポンプ：PP金属
ボトル：PE
外装フィルム：PE



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822



必ずしっかりと使用ください

