

5. 使用上の注意のつづき
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLに薄めて、1日数回うがいでください。

【用法用量に関連する注意】

- 用法用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- うがい用にのみ使用してください。
- 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください。

【成分分量】 100mL中

ポビドンヨード7.0g (有効ヨウ素700mg) 含有
 添加物：エタノール、1-メントール、サッカリンNa水和物、プロピレングリコール、香料

【成分分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。

お出かけのあとに

お口の


殺菌・消毒

を

ポビドン
ヨード製剤

使用方法

添付の計量カップを斜めにして本剤を2～4目盛のところまで入れ、水を60の目盛まで加えて薄めてからうがいでください。



上の目盛
までが4mL

下の目盛
までが2mL

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhijai_gai_camp/index.html
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



製造番号
使用期限

第3類医薬品

ポビドン
ヨード製剤

細菌・真菌、
ウイルス
などを

殺菌・消毒

ポビドン
ヨード製剤

のどの

殺菌・消毒

口臭の除去に

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

ケンエーうがい薬S

ケンエーうがい薬Sは、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 口内のひどいただれのある人。
- 甲状腺機能障害の診断を受けた人。

*以下右側面へ

ケンエー
うがい薬_S



130mL 計量カップ付

健栄製薬株式会社
 大阪市中央区伏見町2丁目番8号
 電話番号 06(6231)5626