

A B C D 1 2 3 4

開封口

使用前にこの説明文書を必ず読むこと

△ 使用上の注意

※ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。口内のひどいだれ。
- (3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ・じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

販売名：ポビドンうがい薬 第3類医薬品

効能又は効果
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法及び用量

1回、本剤2～4mLを、約60mLの水ですすめて、1日数回うがいしてください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。コップを水平にもどし、上部の水平の線まで水を入ると、約60mLになります。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) うがい用のみ使用すること。
- (3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用すること。

成分及び分量 1mL中

ポビドンヨード 70mg(有効ヨウ素7mg)

添加物：サッカリンナトリウム水和物、トメントール、ユーカリ油、エタノール、炭グリセリン、マコロール400、ヨウ化カリウム、香料

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流すこと。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。(使用期限は箱側面・ボトル底面に記載)



ポビドン

第3類医薬品

うがい薬



使いやすい
計量コップ付き

ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒

開封年月日

開封時に記入してください。

ポビドン

第3類医薬品


うがい薬

使いやすい計量コップ付き

ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒



〈うがいのしかた〉



- 1. 計量コップをかたむけて、本品を2と4の線の間まで入れます。
- 2. コップを水平に戻し、60の線まで水を入れます。

1度目のうがい(口臭除去)

うがい液を口に含み、口全体にいきわたるようにクチュクチュとうがいます。



2度目のうがい(殺菌・消毒)

のどの奥まで、うがい液が届くように上を向いてガラガラとうがいます。



使用
期限

製造
番号

玉川衛材(株) お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931

製造販売元 玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19

120mL

4 901957 050369 1307-01 1 2 3 4 5 6



MADE IN JAPAN

KE08-AH-SP



開封口

使用前にこの説明書を必ず読むこと

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人には使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

■ 相談すること

1. 次の人には使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 次の症状のある人。口内のひどいだれ。
(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

うがい薬 Gargle 第3類医薬品

ポビドンうがい薬

効能又は効果 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法及び用量

1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがってください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。コップを水平にもとし、上部の水平の線まで水を入ると、約60mLになります。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) うがい用のみ使用すること。(3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用すること。

成分及び分量 1mL中

ポビドンヨード 70mg(有効ヨウ素7mg)
添加物：サッカリンナトリウム水和物、L-メントール、ユーカリ油、エタノール、濃グリセリン、マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(4) 誤用の原因になったり品質が変わる。(5) 薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流すこと。(6) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。(使用期限は箱側面・ボトル底面に記載)



HapYcom 第3類医薬品 120mL

うがい薬

ウイルス
細菌・真菌



殺菌・消毒 1日数回、1回2～4mLを約60mLの水でうすめてうがい

開封年月日

開封時に記入してください。

HapYcom 第3類医薬品

うがい薬

ウイルス
細菌・真菌


殺菌・消毒

使いやすい
計量コップ付き



内容量 120mL 液体の色 黒褐色

〈うがいのしかた〉



1度目のうがい(口臭除去)

うがい液を口に含み、口全体にいきわたるようにクチュクチュとうがする。



2度目のうがい(殺菌・消毒)

のどの奥まで、うがい液が届くように上を向いてガラガラとうがする。



使用
期限

製造
番号

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931

製造販売元 玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19

ポビドン

第3類医薬品

うがい薬

ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒



使いやすい
計量コップ付き
開封年月日

120mL

開封時に記入してください。

ポビドンうがい薬 第3類医薬品

【成分及び分量】 1mL中 添加物
ポビドンヨード…70mg(有効ヨウ素7mg)
サッカリンナトリウム水和物、L-メントール、
ユーカリ油、エタノール、濃グリセリン、
マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料

【効能又は効果】 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
【用法及び用量】 1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日
数回うがいしてください。

【注 意】 ●次の人は使用しないこと。(1)本剤又は本剤の成分に
よリアレルギー症状を起こしたことがある人。●次の人は使用前に医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)薬などによリアレ
ルギー症状を起こしたことがある人。(2)次の症状のある人。口内のひど
いただれ。(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。●使用に際しては
外箱に記載された説明文をよく読むこと。●直射日光の当たらない湿気
の少ないところに密栓して保管すること。●小児の手の届かないところに
保管すること。●うがい用にのみ使用し、内服しないこと。●使用期限の
過ぎた製品は使用しないこと。(使用期限はボトル底面に記載)

タマガワ
エーザイ

製造販売元
玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931



ボトル
キャップ
コップ

KE04-O-SP

開封時に記入してください。
開封年月日

ポビドン

第3類医薬品

うがい薬


ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒



300mL

タマガワ
エーザイ

使いやすい計量コップ付き



1. 計量コップをかたむけて、本品を2と4の線の間まで入れます。
2. コップを水平に戻し、60の線まで水を入れます。

本品は透明シユリンクフィルムで包装しています

販売名:ポビドンうがい薬

第3類医薬品

使用前にこの説明書を必ず読むこと

使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)次の症状のある人。□内のひどいだれ。(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。


症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能又は効果】

□腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法及び用量】1回、本剤2~4mLを、約60mLの水ですめて、1日数回うがいしてください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。コップを水平にもどし、上部の水平の線まで水を入ると、約60mLになります。(用法及び用量に関連する注意)
 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)うがい用のみ使用すること。(3)本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用すること。【成分及び分量】1mL中ポビドンヨード...70mg(有効ヨウ素7mg) 添加物:サッカリンナトリウム水和物、L-メントール、ユーカリ油、エタノール、濃グリセリン、マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料(成分及び分量に関連する注意)本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流すこと。(5)使用期限をすぎた製品は使用しないこと。(使用期限はボトル底面に記載)



玉川衛材(株)お客様相談窓口
 TEL.03-4334-8857
 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

KE06-O-SP



副作用被害救済制度
 TEL.0120-149-931

ボトル
キャップ、コップ
外装フィルム

製造販売元 玉川衛材株式会社
 東京都千代田区富士見1-8-19

HapYcom 第3類医薬品

うがい薬

ウイルス 細菌・真菌

殺菌・消毒

内容量 300mL

使うやすい計量コップ付き



1. 計量コップをかたむけて、本品を2と4の線の間まで入れます。

2. コップを水平に戻し、60の線まで水を入れます。

開封時に記入してください。

本品は透明シロリンクフィルムで包装しています

販売名: ポビドンうがい薬

第3類医薬品

使用前にこの説明文書を必ず読むこと

使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 次の症状のある人。口内のひどいただれ。(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能又は効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法及び用量】1回、本剤2~4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいしてください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。コップを水平にもとし、上部の水平の線まで水を入れると、約60mLになります。〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) うがい用にはのみ使用すること。(3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用すること。【成分及び分量】1mL中ポビドンヨード…70mg(有効ヨウ素7mg)添加物: サッカリンナトリウム水和物、l-メントール、ユーカリ油、エタノール、濃グリセリン、マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料〈成分及び分量に関連する注意〉本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流すこと。(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。(使用期限はボトル底面に記載)



KE09-AH-SP

玉川衛材(株) お客様相談窓口
TEL.03-4334-8857
 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度
TEL.0120-149-931

製造販売元 **玉川衛材株式会社**
 東京都千代田区富士見1-8-19

ボトル
 キャップ・コップ
 外装フィルム