

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

うがい薬

第3類医薬品

うがい薬 グルベル®

口やのどは、食物に付着した病原菌や大気中の病原菌・有害物質に直接触れるために、しばしばはれて痛んだりします。

なかでも風邪に伴うのどの炎症、大気の汚染によるのどや口内の炎症は意外に多いものです。従って、のどや口内の衛生にはたえず注意を払わなければなりません。

グルベルは、すぐれた消炎作用を有する成分アズレンスルホン酸ナトリウムを主成分とするうがい薬で、とくにのどや口内がはれて痛む場合などにすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
次の症状のある人
口内のひどいだれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
口	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄

用法・用量

通常1包(2.0g)を水または微温水約100mLに入れ、よくかき混ぜて溶かした後、数回うがいします

これを1日数回行います

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (3)うがい用에만使用してください

成分・分量

1包(2.0g)中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム (水溶性アズレン)	2mg	口腔内の粘膜に直接的、局所的に作用し、強い消炎作用をあらわします
炭酸水素ナトリウム	1500mg	口腔内組織の粘液を溶解、洗浄する作用をもち、水溶性アズレンが患部に直接作用するように働きます

添加物として、D-マンニトール、香料、ポビドンを含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174 (代表)
受付時間：午前9：00から午後5：00まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3