

**のどの殺菌  
消毒  
口臭除去に  
コデトン  
うがい薬**



**300mL**  
計量コップ付

**第3類医薬品**

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

製造販売元

**福地製薬株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は製造販売元までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

受付時間：9時から17時まで  
TEL:0748-52-2323  
(土、日、祝日を除く)

2012年8月 記載要領変更に伴う改訂

【販売名】コデトンうがい薬 【第3類医薬品】

本剤のご使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

**△使用上の注意**

**☒してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**☒相談すること**

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。口内のひどいただれ
  - 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、悪苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能・効果】**

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

**【用法・用量】**

1回、本剤2～4mL(添付の計量コップ2～4目盛)を水約60mL(計量コップ60目盛)にうすめて、1日数回うがいしてください。

**<用法・用量に関連する注意>**

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
うがい液をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- うがい用のみ使用し、内服しないでください。
- 本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。

**【成分・分量】**

1mL中 ポビドンヨード……………70mg  
(有効ヨウ素7mg含有)

添加物：ヨウ化K、L-メントール、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコール

**<成分・分量に関連する注意>**

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさげ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。  
落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム(ハイポ)で洗ってください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。



キャップ:PP  
ボトル:PE  
外装フィルム

AKY1