

のどの 消毒・殺菌 口臭除去に ポビドンヨードの うがい薬

【用法・用量】

1回、本剤2~4mL(添付の計量コップ2~4目盛)を水約60mL(計量コップ60目盛)にうすめて、1日数回うがいしてください。

300mL
(計量カップ付)

第3類医薬品

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

本品についてのお問い合わせ
は、お買い求めのお店又は製造
販売元までご連絡頂きますよう
お願い申し上げます。

受付時間: 9時から17時まで
TEL:0748-52-2323
(土、日、祝日を除く)

2012年8月 記載要領変更に伴う改訂

【販売名】エピックうがい薬 第3類医薬品

【本剤のご使用前に、この説明事項を必ずお読みください。】

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 痢などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
(2) 次の症状のある人。口内のひどいただれ
(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害
2. 本剤は、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤2~4mL(添付の計量コップ2~4目盛)を水約60mL(計量コップ60目盛)にうすめて、1日数回うがいしてください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
うがい液をはさだせない年齢の小児には使用させないでください。
- (3)うがい用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。

【成分・分量】

1mL中 ポビドンヨード.....70mg
(有効コウ素7mg含有)

添加物: ヨウ化K、メントール、D-ソルビトール液、ザッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコール

<成分・分量に関する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3.誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 4.薬液や衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。
落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム(ハイポ)で洗ってください。
- 5.使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- 6.添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。



キャップ: PP
ボトル: PE
外袋: フルム

AKY1