


のどの殺菌
消毒
口臭除去に
ポビドンヨードの
うがい薬

第3類医薬品



第3類医薬品

第3類医薬品

【販売名】 コフピタうがい薬

【成分・分量】 (1mL中)
ポビドンヨード……………70mg
(有効ヨウ素7mg含有)
添加物:ヨウ化K、L-メントール、D-ソルビ
トール液、サッカリンナトリウム水和物、グリ
セリン、アルコール
〈成分・分量に関連する注意〉
本剤の使用により、銀を含有する歯科材料
(義歯等)が変色することがあります。また、
ごくまれに歯などの表面の状態により着色
することがあります。

【効能・効果】
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、
口臭の除去

【用法・用量】
1回、本剤2~4mL(添付の計量コップ2~4
目盛)を水約60mL(計量コップ60目盛)に
うすめて、1日数回うがいでください。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法及び用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指
導監督のもとに使用させてください。うが
い液をはきだせない年齢の小児には使用
させないでください。(3)うがい用のみ使
用し、内服しないでください。(4)本剤は使
用する時のみ希釈し、うすめた液は、早めに
使用してください。
(5)使用方法 うがいの仕方
キャップをあけて容器をさかさに持ち、指
でゆっくり押して本剤2~4mL(添付の計量
コップを斜めにして、2~4目盛)をとり、水
でうすめて約60mL(計量コップを水平にも
どし目盛60)にし、ていねいにうがいでし
てください。




ポビドンヨードの

うがい薬

のど・口腔内の

細菌からウイルス
まで



計量コップ付

130mL

ご使用に際して、この箱の説明を必ず
お読みください。また、必要なときに読める
よう大切に保管してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し
て保管してください。(2)小児の手のとどか
ない所に保管してください。(3)誤用をさけ品質
を保持するため、他の容器に入れ替えない
でください。(4)薬液が衣類に付着した時は、
すぐに水または洗剤で洗ってください。落ち
にくい場合にはチオ硫酸ナトリウム(ハイ
ポ)で洗ってください。(5)使用期限をすぎた
製品は使用しないでください。(6)添付の目
盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなど
して常に清潔に保管してください。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

福地製薬株式会社
滋賀県瀬田郡日野町寺尾824
お客様相談室☎0748-52-2323
(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー
一症状を起こしたことがある人。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください
(1)薬などによりアレルギー一症状を起
こしたことがある人。(2)次の症状のある
人。口内のひどいただれ。(3)次の診断
を受けた人。甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合
は、副作用の可能性があるので、直ちに
使用を中止し、この箱を持って医師、歯
科医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------|
| 皮膚(ふ) | 発疹・発赤、かゆみ |
| □ | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器 | 吐き気 |
| その他 | 不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こること
があります。その場合は直ちに医師の
診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに皮膚のかゆ み、じんましん、声のかす れ、くしゃみ、のどのかゆ み、息苦しさ、動悸、意識の 混濁等があらわれる。 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくなら
ない場合は使用を中止し、この箱を持
って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください