

計量カップ付で便利

うがい薬

ポビドンG 120mL

第3類医薬品

うがい薬 120mL

【用法・用量】

1回、本剤2~4mLを水約60mLに薄めて、1日数回うがいをしてください。

△ 用法及び用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)うがい用のみ使用してください。
- (3)用法・用量をお守りください。

【成分・分量】 100mL中

成分	含量
日局ポビドンヨード	7g(有効ヨウ素700mg)
はたらき	添加物:エタノール、グリセリン、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム、L-メントール
のどを殺菌消毒します	

△ 成分及び分量に関連する注意

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)衣類などに付着した場合、水か洗剤でなるべく早く洗い落としてください。(5)火気に近づけないでください。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売 共立薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

お客さま相談室 ☎0744-52-4741
受付時間9:00~17:00(土・日・祝を除く)




計量カップ付で便利

うがい薬

ポビドンG 120mL

効能: のどの殺菌・消毒 洗浄、口臭の除去

第3類 成分:日局ポビドンヨード
医薬品



うがい以外には使用せず、ご使用の際は【用法・用量】を守って正しくお使いください



使用期限/製造番号



本剤をご使用になる前に、下記の説明文書を必ずお読みください

2013.09改訂 △ 使用上の注意

※**してはいけないこと**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

※ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)次の症状のある人。口内のひどいだれ

2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	皮膚	口	消化器	その他
症状	発疹・発赤、かゆみ	あれ、しみ、灼熱感、刺激感	吐き気	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931(フリーダイヤル)


計量カップ付で便利

うがい薬

ポビドンG 120mL

効能: のどの殺菌・消毒 洗浄、口臭の除去

第3類 成分:日局ポビドンヨード
医薬品



うがい以外には使用せず、ご使用の際は【用法・用量】を守って正しくお使いください