

**【使用上の注意】****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

(3) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (7717キナー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**

大阪府中央区道修町二丁目5番14号

お客様相談室 ☎ 06-6202-8911

受付9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **昭和製薬株式会社**

大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号

**KAIGEN**

**のどの殺菌**

**消毒**

**口臭除去に**



**爽やかなユーカリの香り**

**うがい薬 / ポビドンヨード製剤**

**ガーグルフレッシュ**

第3類医薬品

**【効能・効果】**

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

**【用法・用量】**

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法及び用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい薬をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
3. うがい用のみ使用し、キズややけどへの使用や内服しないでください。
4. 本剤は使用するときうすめて、早めに使用してください。

**【成分・分量】**

本品1mL中ポビドンヨード70mg

(有効ヨウ素 7mg含有)

添加物として、エタノール、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム水和物、ユーカリ油を含む。


＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。


**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 衣類等に付着したときはすぐに洗い流してください。
- ご使用後はすぐに洗面台等を水で洗い流してください。(そのまま放置すると、洗面台等が変色することがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

**【使用方法】**

① 本品を2と4の線の間まで入れる。



② 水を60の線まで加え、うすめてからうがいです。