

【使用上の注意】

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人。口内のひどいただれ

(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

爽やかなユーカリの香り

ポビドンがイS

第3類医薬品

300mL

ポビドンヨード製剤

のどの殺菌・消毒 口臭の除去

【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいでください(付属のコップの2と4の線の間まで本品を入れ、水を60の線まで加え、うすめてからうがいでください)。

【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい薬をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
3. うがい用にのみ使用してください。
4. 本剤は使用するときうすめて、早めに使用してください。

【成分・分量】


本品1mL中、ポビドンヨード 70mg(有効ヨウ素 7mg含有) 添加物として、エタノール、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム水和物、ユーカリ油を含む。

【成分・分量に関連する注意】


本剤の使用により銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
4. 衣類等に付着したときはすぐに洗い流してください。
5. 使用後はすぐに洗面台等を水で洗い流してください(そのまま放置すると、洗面台等が変色することがあります)。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度
☎0120-149-931



ポトル
キャップ
フィルム
ラベル

製造販売元 昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12
お問い合わせ 06-6996-5111
受付9時～17時(土・日・祝日を除く)