

## 【使用上の注意】

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
**次の人は使用しないでください。**  
 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人: 口内のひどいだれ
  - 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の下重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (777イキネ)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

昭和製薬株式会社

お客様相談窓口 0120-920-598

受付時間 9～17時(土・日・祝日を除く)

# ポビドンヨード うがい薬

(ポビドンヨード製剤)

のどの殺菌・消毒  
口臭除去に



300mL

第3類医薬品

販売元

滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008番地

東洋化学株式会社

## 【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

## 【用法・用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがってください(付属のコップの2と4の線まで本品を入れ、水を60の線まで加え、うすめてからうがってください)。

## 【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい薬をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- うがい用にのみ使用し、キズややけどへの使用や内服しないでください。
- 本剤は使用するときうすめて、早めに使用してください。

## 【成分・分量】

本品1mL中、ポビドンヨード 70mg

(有効ヨウ素 7mg含有)

添加物として、エタノール、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム水和物、ユーカリ油を含む。

## 【成分・分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 衣類に付着したときはすぐに洗い流してください。
- 使用後はすぐに洗面台等を水で洗い流してください(そのまま放置すると、洗面台等が変色することがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



ポトル  
キヤップ  
ラブルム  
ラベル  
コップ



販売名: ポビドンうがい薬S 第3類医薬品

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

## 使用方法



- 1 本品を2と4の線の間まで入れる



- 2 水を60の線まで加え、うすめてからうがいする

