

開封後、
3ヶ月以内
で
使用してください

パールジョット
うがい薬F
50mL [第3類医薬品]



会 社 名 第3類医薬品

第3類医薬品

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

小児用への注意

■相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人

- 口内のひびいたれ
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

患部部位	症 状
口	刺激感

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しいところに保管してください
- (2)小児の手が届かない所に保管してください
- (3)他の容器に移し替えないでください(蓋の取っ手に付いた品名が変わる場合があります)
- (4)瓶뚜けを交換等に行う場合は、すぐに水でよく洗い落としてください
- (5)新鮮な水は使用のつど、水を使い等して常に清潔に保管してください
- (6)使用期限をすぎた製品は使用しないでください(使用期限はパッケージ背面に記載しております)
- (7)火気には近づけないでください

口の中やのどの
ハレ・洗浄に

うがい薬



抗炎症成分配合

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

パールジョットうがい薬F 50mL

パールジョットうがい薬F

効能・効果 口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄

成分・分量 (本品100mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 0.4g

添加物としてエタノール、 β -メントール、クエン酸Na、香料、その他3成分を含有する

用法・用量

1回約0.5mLの水を水又は微温湯約100mLに溶めて、数回うがいをしてください。これを一日数回行ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください(必ず守って使用してください)
- (2)小児に使用させる場合には、必ず保護者監督のもとに使用させてください
- (3)目に入らないよう注意してください
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受けてください
- (4)使用後はノズル付近をティッシュペーパー等で拭き取り、清潔に保つてからキャップをしっかりはめてください
- (5)うがい用のみ使用し、内服剤やのどスプレーとして使用しないでください
- (6)本品はご使用の度に薄め、薄めた後は早めにご使用ください
- (7)1回の計量量は目印ですので、カップの目盛りで確認してから溶めてください
- (8)強い歯磨き粉をすすぐと液ダレを起こす場合があります

50mL (約100回分)

開封口

うがい液のうすめ方

1. 本剤をカップへ1杯(分(約0.5mL))入れてください。
※アの時カップ底面の目盛りが水平になる様にカップを傾けてください。(45°)
2. カップをも水平に返し、上部に刻んである100の線まで水を入れます。(水 約100mL)



最初ほうがい液が出るまで数回回し、アください。

発売元:白金製薬株式会社

〒634 0803 奈良県橿原市上宮寺町516

各規格取扱室 11L/L/44-L/55-L/88-L/100-L/1700-L (B、Cを除く)

製造販売元:ダイワ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上宮寺町515

制作用紙製薬 番0120-148-931

2405A06



4 935583 204612



計量カップ:PE

製造番号

使用期限