

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読むよう大切に保管してください。

▲使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 口の中に傷やひどいただれのある人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口腔内の
殺菌・消毒・洗浄

うがい薬
300 SP

第2類医薬品 コップ付

ゴロ
ゴロ



20mL

商品の詳しい
情報はこちら



第2類医薬品

【販売名】うがい薬300SP

【効能又は効果】口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法及び用量】キャップ7分目の水に、本剤を5～7滴落とし(80～100倍にうすめて)、1日数回うがいをしてください。

〈用法及び用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) うがい用にのみ使用すること。(3) 定められた用法及び用量を守ること。(4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、希釈後は早めに使用すること。

【成分及び分量】本剤は、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩を0.1g、その他添加物としてℓ-メントール、ポリソルベート80、炭酸水素ナトリウム、エタノール、プロピレングリコール、香料、黄色5号、その他1成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないこと。

【お問い合わせ先】本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 お客様相談窓口
TEL.06-6797-2525
受付時間：9:00～18:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
☎ 0120-149-931