

咽喉・喉頭炎 風邪の予防 声がれに

うがい

ミチノ

吸入原液

* **第3類医薬品**

含嗽吸入原液ミチノ

製品の特徴

うがい・吸入原液**ミチノ**は、うすめて使う、うがいと蒸気吸入器用の薬です。のどの痛みがあるとき、風邪の予防や声がれ、歯ぐきや口内の粘膜が炎症をおこしたとき、そして口臭のあるとき、本剤は殺菌消毒作用によって患部の諸症状の緩和をはかります。

●蒸気吸入器でのど・声帯の痛みの緩和に

口やのどは細菌や雑菌の侵入口であり、菌が繁殖しやすいところです。ここで殺菌し、菌の侵入を防ぐことによって口やのどから病気がひろがるのを防ぐことができます。蒸気吸入器で吸入することによって、うすめられた本剤がうがいでは届かないのどの奥や声帯、気道に蒸気とともに送り込まれ、患部を殺菌消毒し、痛みをやわらげます。

●口腔内・のどの殺菌・消毒に

歯ぐきや口内の粘膜が充血、腫(は)れ、ただれ、痛みなどを起こしたとき、うがい・吸入原液**ミチノ**によるうがいによって、患部の殺菌・消毒・清浄の効果をあらわします。また、朝起きたとき、食事のあと、お休みに本剤でうがいをするにより、口腔内の清潔さを保ち、口臭の除去にも効果を発揮します。



使用上の注意

**

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)口内のただれがひどい人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)本剤の使用により、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口、のど	刺激感

(2)本剤を5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

* * 咽喉炎・喉頭炎・扁桃腺炎・口内炎・急性慢性気管支カタル・歯齦炎・口臭の除去・感冒の予防・声がれ

〔用法・用量〕


1 回約0.2～0.4mL(5～10滴)を水50～100mLにうすめて、1日数回うがい、又は吸入器を用いて吸入してください。(普通コップ半分が100mLです。)

(1)用法・用量を守ってください。

- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)水でうすめた場合、薬液が白濁し、または油状のものが浮くことがあります。これは本剤の成分が出てきたもので異常ではありません。ぬるま湯を使用すればこれをさけることができます。
- (4)本剤は、うがいと吸入にのみ使用し、内服や眼科用目薬等と誤用しないようよく注意してください。
- (5)本剤は、ネブライザーに使用しないでください。

■蒸気吸入器にご使用の場合の注意

- (1) 蒸気吸入器の薬液コップに水を入れ、本品を数滴、滴下して吸入してください。50mLの水に対して、本品5滴(約0.2mL)の割合です。必ずうすめてご使用ください。
- (2) 蒸気吸入器の薬液コップの素材によっては、本剤により薬液コップが白くにごったり、不透明になったりするものもあります。この場合薬液に変化はありませんので安心してお使いください。
- (3) ご使用後は、薬液コップを水またはぬるま湯でよく洗ってください。



●蒸気吸入器の薬液コップ

*〔成分及び分量〕

本剤100mL中

アクリフラビン	0.01 g
チモール	0.01 g
dℓ-カンフル	7.00 g
ℓ-メントール	3.00 g

添加物として、エタノール、塩化ナトリウム、精製水を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光を避け、なるべく涼しい所に、栓をしっかりとって保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

〔包 装〕

30mL・100mL

本品についてのお問い合わせ先

- ミチノ製薬株式会社 電話03-3786-0630

製造販売元
(吸入器製造・販売元)

ミチノ製薬株式会社
東京都品川区旗の台2丁目1番6号

* 副作用被害救済制度
☎0120-149-931