

この説明書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔の内服薬《痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血》

**エフレチン<sup>®</sup>G顆粒**

第2類  
医薬品

痔の症状は、出血、痛み、炎症などがあらわれるので、痔の内服薬としては、止血、鎮痛、抗炎症、血流改善、緩下作用の効果が必要とされます。

エフレチンG顆粒は、これらの作用をもつ生薬のみを配合した痔の内服薬です。

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

下痢

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、吐き気・嘔吐、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

## ■ 効能・効果

次の場合の症状の緩和：

痔核（いぼ痔）、きれ痔、痔出血

## ■ 用法・用量

1日3回、食後に次の量を水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量
成人（15才以上）	1包

### 【用法・用量に関連する注意】

用法及び用量を必ず守ってください。

## ■ 成分と働き



1包（1.1g）中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働 き
カイカ末	200mg	毛細血管を強化することにより止血効果があります。
カンゾウ末	100mg	消炎効果と括約筋の緊張を緩和する効果があります。
トウキ末	240mg	血流改善作用と緩下作用があります。
ダイオウ末	200mg	緩下作用があります。
サイコ末	200mg	鎮痛効果及び脱肛改善効果があります。
メリロートエキス	30mg	血流改善効果と消炎効果があります。

添加物としてCMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、トウモロコシデンプンを含んでいます。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果が変わりありません。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## ■ お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100  
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造販売元  
**三宝製薬株式会社**

東京都新宿区下落合2-3-18