

第2類医薬品

生薬 じ えん じょう 治焱錠

奈良大和生薬

生薬 匠 シリーズ 第2類医薬品

いぼ痔 きれ痔 飲んで効く医薬品

31日分
279錠

生薬 じ えん じょう 治焱錠

黄柏・甘草・紅花・柴胡・升麻
蒼朮・大黃・陳皮・当歸・桃仁

奈良大和生薬



開封口

服用前に、箱の説明書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

販売名：治焱錠

第2類医薬品

【成分・分量】 1日量9錠(2.7g)中

| | |
|-------|--------|
| オウバク | 0.30g |
| カンゾウ | 0.95g |
| コウカ | 1.35g |
| サイコ | 1.35g |
| ショウマ | 1.35g |
| ソウジュツ | 2.0g |
| ダイオウ | 0.35g |
| チンピ | 0.50g |
| トウキ | 0.675g |
| トウニン | 0.675g |

エキス…1.5g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 3錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

【効能・効果】 次の場合の症状の緩和：痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血

使用上の注意

❌ **してはいけないこと**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸が弱く下痢しやすい人 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の症状のある人 下痢 (7)次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤)
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|----------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)容器の中の詰め物は、開封後に捨ててください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
- (5)服用の都度、容器のキャップをしっかり閉めてください。
- (6)錠剤は濡れた手で扱わないでください。
- (7)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬
医薬品相談窓口
☎0120-005-189
受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市二条大路南1-2-11

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号



詰め物:PE