

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要などきに読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

痔疾内服治療剤 痔に光

■ 痔疾用内服薬 ■ 販売名：痔疾内服治療剤 痔に光

痔疾内服治療剤 痔に光は、生薬を原料とした黄色の糖衣錠です。

痔疾内服治療剤 痔に光は、肛門部の血行を高め、痔粘膜の充血除去・消炎・止血を助け、主にいぼ痔（痔核）の人に効果があります。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
下痢
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、吐き気・嘔吐

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

脱肛、肛門裂傷（きれ痔）、いぼ痔並びに痔疾患からの諸症状（痔出血、肛門周囲炎、肛門搔痒症等）

■ 用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	3～5錠	朝夕 2回 ・空腹時または就寝前に服用してください。
15歳未満の小児	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量（10錠中）

サイコ抽出エキス ……………	80 mg	ショウマ抽出エキス ……………	80 mg
ボタンビ抽出エキス ……………	80 mg	トウニン抽出エキス ……………	80 mg
ブクリョウ抽出エキス ………	80 mg	シャクヤク抽出エキス ………	80 mg
センナ末 ……………	450 mg	オウバク末 ……………	220 mg

※添加物としてカルメロースNa、パレイシヨデンブン、ステアリン酸Mg、セラック、アラビアゴム、白糖、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、サラシミツロウ、黄色5号を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
5. ビンの中には乾燥剤が入っています。服用しないでください。
6. 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
7. 一度開封した後は、服用のつどビンのフタをよくしめ、品質保持の点から開封日より6ヶ月以内にご使用ください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668 (代表)

受付時間：10:00～16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **合名会社 東宝製薬**
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地