



2013年2月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

## 外用痔疾用薬 ジーフォーL 注入軟膏

プレドニゾン酢酸エステル配合

ジーフォーL注入軟膏は…

- 患部のかゆみやはれ・出血を抑えるプレドニゾン酢酸エステルを配合しています。
- 手を汚さず、直接患部に塗布及び注入できます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### 〔効 能〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和



**〔用法・用量〕**

〈肛門内に注入する場合〉

ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15才以上)	1個	1~2回
15才未満	使用しないでください	

〈肛門部に塗布する場合〉



次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15才以上)	適量	1~3回
15才未満	使用しないでください	

**〔用法・用量に関連する注意〕**

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児には使用させないでください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

**〔注入する場合〕**

①	②
	
①キャップを取りボディを押し軟膏を少し先端部に出します。	②ノズルを肛門内に挿入しボディを押し、ゆっくり注入して押したままで引きぬいてください。 ※全量を1回で注入してください。

**〔塗布する場合〕**


キャップを取り、軟膏をそのまま肛門部に塗布してください。

**〔成分・分量と働き〕** 1個(2g)中

成 分	分 量	働 き
プレドニゾン酢酸エステル	1mg	患部のかゆみやはれを抑えます。
リドカイン	60mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。
アラントイン	20mg	粘膜の修復を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	50mg	血行を促進し、患部のうっ血(血がとどこおること)を改善し、効果をあらわします。

添加物として、流動パラフィン、モノステアリン酸グリセリン、縮合リシノレイン酸ポリグリセリル、白色ワセリンを含有します。

**◎保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (5) 使用済みの容器はトイレに流さないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
**佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口**  
 電話 03(5412)7393  
 受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元  
**佐藤製薬株式会社**  
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元  
**万協製薬株式会社**  
 三重県多気郡多気町五桂1169-142