

2013年2月 記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



きれ痔・さけ痔・いぼ痔に
ジーフォーL軟膏

プレドニゾン酢酸エステル配合

ジーフォーL軟膏は…

- プレドニゾン酢酸エステルが痔のかゆみやはれ・出血にすぐれた効果をあらわします。
- 痛みを抑える局所麻酔薬リドカイン、細菌感染を防ぐセチルピリジニウム塩化物水和物を配合しています。
- 痔疾患に伴うかゆみを抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩、血管を収縮させ、はれ・出血を抑えるナファゾリン塩酸塩を配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



〔効 能〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

〔用法・用量〕

1日3回、適量を肛門部に塗布します。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)肛門部にのみ使用してください。


〔成分・分量と働き〕1g中

成 分	分 量	働 き
プレドニゾン酢酸エステル	1mg	患部のかゆみやはれ・出血を抑えます。
リドカイン	30mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg	患部のかゆみを抑えます。
アラントイン	10mg	粘膜の修復を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	30mg	肛門周囲の血行を促進し、患部のうっ血(血がとどこおること)を改善します。
セチルピリジニウム塩化物水和物	2mg	傷口への細菌感染を防ぎます。
ナファゾリン塩酸塩	0.3mg	血管を収縮させ、はれ・出血を抑えます。

添加物として、スクワラン、セタノール、ワセリンを含有します。

〈チューブの穴の開け方〉

1. キャップをはずします。
2. 突起部がある方をチューブの先端口に強く押し当てて穴を開けてください。
3. キャップを元にもどし、ワンタッチキャップとしてお使いください。



◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (5)寒さで軟膏が硬くなり出しにくいときは、チューブをしばらく手の中で暖めてからお使いください。



◎早くよくなっていただくためのアドバイス

肛門の周囲には細い静脈が網の目のように入り組んでいます。この静脈の血液の流れが悪くなると、うっ血やはれが起こります。また、排便などの刺激で出血、痛み、かゆみなどを起こします。

1. 硬い便は肛門に傷をつけたり、出血や脱肛の原因となりますから、食事に注意し、便秘にならないように心がけてください。
2. ぬれたガーゼで拭く、こまめに入浴をするなど、患部を常に清潔に保つように心がけてください。
3. 座る、かがむなど患部にうっ血を起こしやすい姿勢を長く続けないでください。
4. お酒や香辛料の入った食べ物、タバコなどはなるべくさけるようにしてください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号