

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

《非ステロイド系抗炎症剤配合》

新エフレチン[®]軟膏

第2類医薬品

〔痔疾用外用薬〕

痔は便秘や排便の力みなどが誘因となって、肛門周囲の細かい静脈の血液の流れが悪くなり、うっ血して、出血、痛み、かゆみなどをともない、ひどくなると細菌の感染によって、炎症や化膿などの症状をあらわします。

痔核（いぼ痔）が肛門の皮膚に近い所にあるものは痛みが強く、肛門内部の粘膜にあるものは、痛みがほとんどなく、出血をとまうことがあります。また、肛門内部に亀裂ができ、大便が通過するたびに激しい痛みがある場合（きれ痔、さけ痔）などがあります。

一般に痔という場合には、いぼ痔、きれ痔、軽度の脱肛などを合併していることが多くみうけられます。

新エフレチン軟膏はこのような症状を緩和するため、患部へ塗りやすく、使いやすくなった軟膏です。炎症をおさえるグリチルレチン酸、血液の循環を促進するトコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）、痛み、かゆみを止めるリドカイン、そのほか止血、殺菌剤などを配合しています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和及び消毒

■ 用法・用量 ■

適量を取り、肛門部に塗布してください。
なお、1日3回まで使用できます。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

【使用時のアドバイス】

- 入浴後や就寝時に使用することが効果的です。
- 排便後は、ぬるま湯でしめした脱脂綿などで患部を洗い、湿気を十分にとり除いてから本剤を用いると効果的です。また前回患部に使用した軟膏は、ぬるま湯などで、できるだけふきとってから新しい軟膏を使用してください。
- 脱脂綿を用いる場合は、3センチ平方ぐらいに切り、軟膏を厚めにのばしたものを、肛門内に軽く差し込むようにして立ち上がると、そのまま固定できます。
- 痔疾の発症時には、できるだけ安静就床に心掛け、過食や刺激物をつつしみ、足腰の保温や入浴に努めてください。また、便秘症の方は、便通の調整に心掛けることも大切です。



■ 成分と働き ■

100g中に次の成分を含んでいます。


成 分	含量	働 き
リドカイン	3g	痛みや痒みを抑えます。
グリチルレチン酸	1.5g	炎症・はれを抑えます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.5g	細菌の感染を防ぎ、傷口の悪化を防ぎます。
トコフェロール酢酸エステル	3g	血液循環を改善し、痔の症状を緩和します。
アルミニウム・クロルヒドロキシアラントイネート	1g	出血を防ぎ、傷口のなおりを早めます。
酸化亜鉛	10g	出血を防ぎ、傷口のなおりを早めます。

(油脂性軟膏基剤)

添加物としてジメチルポリシロキサン、セレシン、ミツロウ、ラノリン、ワセリン、香料を含んでいます。

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18