

プレドニゾン酢酸エステル・リドカイン配合

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう保管してください。

メントールのスツットとするクール感で痛みを鎮める **注入軟膏**

デナンコーハイ

第2類医薬品

痔疾用薬

抗炎症作用の顕著なプレドニゾン酢酸エステルを始め、有効成分を軟膏状にして、使いやすい注入式容器に入れた痔疾用薬です。

痛み

局所麻酔作用のあるリドカインで痛みを鎮めます。

出血

エフェドリン塩酸塩で出血を止め、酸化亜鉛で患部を保護します。

はれ・かゆみ

抗炎症作用のあるプレドニゾン酢酸エステルで、はれ、かゆみを抑えます。

- ご使用の前に入浴又はぬるま湯を用い、ガーゼなどで患部をきれいにしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みが激しい時は、1時間ほど前に注入しておきますと、排便時の痛みをやわらげ、便の通りをよくします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

用法・用量

成人(15歳以上)1日1~2回、朝・就寝前・排便後等に患部を清潔にした後、1回1個、肛門部に挿入し、全量を注入する。又は、適量を肛門部に塗布する。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 小児には使用させないこと
- (2) 肛門部のみ使用すること





成分と働き

【成分・分量】1個(2.5g)中	作用
プレドニゾン酢酸エステル… 1.0mg	抗炎症作用
リドカイン…………… 37.5mg	鎮痛、鎮痒作用
エフェドリン塩酸塩 …… 12.5mg	血管収縮作用
酸化亜鉛…………… 150.0mg	収れん、保護作用
メントール…………… 7.5mg	清涼感
添加物として、ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、スクワラン、オリーブ油を含有します。	

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

使用方法及び治療のポイント

<p>① キャップを静かにはずしてください。</p> 	<p>② すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。</p> 	<p>③ 肛門に深く挿入し、容器内の薬剤が十分に注入されるように強く押し出してください。</p>  <p>なるべく深く挿入して下さい。</p> <p>内部に注入する場合</p>	<p>④ 適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。</p>  <p>外部に塗布して使用する場合</p>
---	---	---	---


- 注入式のため、容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填しており、必要量は、肛門内に注入されます。又、寒い時期、容器が多少硬くなりますが、手の中で暖めると出やすくなります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの店または下記までご連絡ください。

ムネ製薬株式会社 〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎 859

消費者相談窓口 電話 0120-85-0107

製造販売元 株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地
1404-TYP

発売元  ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎 859

包装

10個入、30個入
(1個ずつシール包装)

特長

効きめが速い 軟膏状の薬剤が直接患部にとどき、効きめが速くあらわれます。

2通りの使い方 患部が肛門内部(内痔)の場合は注入してください。
患部が肛門外部(外痔)の場合は塗布してください。

衛生的 注入部が細く、スムーズに手を汚さずに自分で注入できます。

養生訓

1. 毎日入浴する。(患部の清潔と血行の改善)
2. 野菜、海藻等繊維の多い食事にする。
(便の量を増やし便をやわらかくし、便通を改善)
3. 香辛料は控えめにする。
(排便時に患部を刺激する)
4. 深酒をつつしむ。
(肛門に負担をかけ、患部のうっ血をまねく)
5. トイレは3分以内にすませ、あと必ず清拭する。