

※のりテープ
日本製 第2類医薬品
10個入

キョウナスG

おしのの健康研究所 非アミノ酸成分※配合

販売名: **ヘモスカットマイルド** 第2類医薬品

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

外用痔疾用薬 内容量: 2.5g × 10個入

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【成分・分量】11個(2.5g)中

成分	分量	はたらき
リドカイン	60mg	患部の痛み、かゆみを抑えます。
酸化亜鉛	250mg	患部を保護・止血し治癒を助けます。
ノゾントイン	20mg	患部の組織を修復し、傷の治りをばやめます。
グリチルレチン酸	10mg	抗炎症作用により炎症、腫れを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	50mg	血行を改善し、うっ血を防ぎます。

添加物: サラシミツロウ、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、ワセリン

【効能・効果】

塗布の場合: 痔核(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和
注入の場合: 痔核(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】

【注入する場合】
ノズル部分を肛門内に挿入し、空気をゆっくり注入してください。

【塗布する場合】

次の量を肛門部に塗布してください。
なお、一錠ずつに使用したものは注入には使用しないでください。

【用法・用量に際する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 肛門部のみ使用してください。
- 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。

製造番号

使用期限

△使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

Ⓜ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

顔面部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 15才未満の小児の手が届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。
- 使用済みの容器等はトイレに捨ててください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

発 売 元: さくらフォレスト株式会社

福岡県福岡市中央区菅原2丁目12-23

【月～金】9:00～18:00 【定休日】土・日・祝

さくらの森相談窓口 ☎0120-842-555

製造販売元: 株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大付町182番地

MADE IN JAPAN



使用方法

注入する場合




①
キャップを外し、すべりをよく
するために薬剤をノズル先端
部から少し出してください。



②
ノズル部分を肛門内に挿入し、
容器を押して薬剤をゆっくり
注入し、押したまま引き抜い
てください。

塗布する場合



適量を患部にそのまま塗るか、ガーゼなどにのばして患部に
あててください。保管の際は、ティッシュペーパーなどでノズル
先端部を拭き、キャップをしっかりとめて清潔に保ってください。

※注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充満しています。

※寒い時期や低温で保管した場合、薬剤が硬くなることがありますが、手の中であたためると軟らかくなります。

おしのび健研究所

あなたのこころを治したいお悩みに寄り添います。

この出会いがあなたの幸運の始まりになりますように♪