

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 〈外用痔疾用薬〉

オシリーフ軟膏

[販売名] オシリーフ軟膏

きれ痔などによるかゆみ・はれ・痛み

特長

- 7つの有効成分ががまんできないつらいお尻(肛門)のかゆみにすぐれた効果を発揮します。
- 患部にしっかり密着する軟膏タイプの治療薬です。
- アルコール・メントール・カンフル無配合で患部にしみにくい処方です。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の人は使用しないでください。
患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読み下さい。

①62025
2501-AHI


効能・効果 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる。

〈チューブ穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



次の注意事項を守ってください

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

成分・分量 [100g中に次の成分を含みます。]

成分	分量	はたらき
リドカイン	3.00g	痛み・かゆみをおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.50g	炎症をおさえ、痛み・かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.10g	殺菌作用があります。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.00g	かゆみをしずめます。
アラントイン	1.00g	患部の組織を修復し、傷の治りをはやめます。
グリチルレチン酸	0.30g	炎症をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	3.00g	血行を改善し、うっ血を防ぎます。

添加物として、流動パラフィン、スクワラン、サラシミツロウ、白色ワセリンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

内容量 15g

お問い合わせ 株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)
発売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29
製造販売元 株式会社 雪の元本店 奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
(フリーダイヤル)0120-149-931