



# おしりのトラブルに... リシーナ<sup>®</sup>

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

第2類医薬品

注入軟膏

人にはなかなか相談できず、ひとりで悩んでしまいがちな痔。  
「痔」に関する情報が盛りだくさん! ロートくらぶへアクセスしてみて!  
<http://www.rohto.co.jp/club/karada/hc006>

- 痛みはないけど便器やティッシュに血が...  
排便してもなんだかスッキリしない...
- 便をする時、した後、  
痛い・ティッシュに血が...
- 肛門のあたりが  
ブクッと腫れて、痛みが...

## ☆肛門内側のはれやいぼ痔(内痔核)などに

内痔核は、肛門内側の静脈の血流が悪くなり、うっ血していぼのように腫れた状態です。感覚神経が通っていない為、軽症時は痛みを感じませんが、排便時に便でこすれて出血してしまうことも。

## ☆肛門外側の切れ痔(裂肛)やいぼ痔(外痔核)などに

裂肛とは、便秘などによる硬い便で、肛門皮フが切れてしまった状態。切れた部分から細菌が入ると化膿したり、長期間裂肛を繰り返していると、肛門が狭くなってしまうことも。

外痔核とは、肛門外側がうっ血して腫れた状態です。肛門皮フは感覚神経が通っているため、痛みを感じ、出血することもある。

こんな痔の症状を感じたら、**がまんをせずに早めに治すことが大切です。**

メンソレータムリシーナ注入軟膏Aは

「**つらい痔の諸症状を効果的に治す**」ことを目的に作られた痔のお薬。

抑える

消炎成分が  
炎症を抑えます。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル

酸化亜鉛

Q-メントール

はれ・ただれ等の  
炎症を抑えます

鎮める

痛みを止める成分

**W**で配合!

つらい痛みを  
しっかり鎮めます。

アミノ安息香酸エチル

リドカイン

つらい痛みとかゆみを  
しっかり鎮めます

改善する

傷ついた組織を修復し、  
ビタミンE誘導体が血流を促進。  
いぼ痔の主な原因である  
うっ血を改善します。

イソプロピルメチルフェノール

患部を殺菌し、細菌感染を防ぎます


アラントイン

傷ついた組織を修復します

トコフェロール酢酸エステル

血行を促進し、うっ血を改善します

- ◆注入部の太さは  
わずか6ミリと細く、  
おしりに負担を  
かけずに挿入できます。



- ◆肛門内疾患、肛門外疾患の  
両方に使用できる、注入・塗布両用タイプ。  
携帯にも便利です。

内部に注入+外部に塗る

2通り

肛門内側などの  
患部に、細くて  
スルッと入れやすい  
メンソレータム  
リシーナ坐剤A  
第2類医薬品



肛門外側などの  
患部には、  
直接塗れる  
メンソレータム  
リシーナ軟膏A  
第2類医薬品



使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:メンソレータムリシーナ注入軟膏A

【痔疾用外用薬】第2類医薬品

## ▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)患部が化膿している人
- 長期連用しないでください。

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 効能・効果

- \* 肛門内部に注入する場合 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
- \* 肛門外部に塗布する場合 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

### 成 分

1個(2.0g)中

有効成分		配合量	有効成分		配合量
アミノ安息香酸エチル		50mg	l-メントール		5mg
リドカイン		45mg	イソプロピルメチルフェノール		2mg
ヒドロコルチゾン酢酸エステル		5mg	アラントイン		12.5mg
酸化亜鉛		100mg	トコフェロール酢酸エステル		25mg

添加物として、ワセリン、ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、トウモロコシデンプン、パラベン、エデト酸Naを含有する。

### 用法・用量

#### \* 肛門内部に注入する場合

肛門内にノズルを挿入し、全量をゆっくりと注入してください。

年 齢	1回量	1日使用回数
15才以上	1個	2回まで
15才未満	使用しないこと	

#### \* 肛門外部に塗布する場合

年 齢	1回量	1日使用回数
15才以上	適量	3回まで
15才未満	使用しないこと	

なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。



#### 【用法・用量に関連する注意】

- <1>用法・用量を厳守してください。
- <2>本剤が、硬すぎる場合には柔らかくなった後に使用してください。
- <3>肛門部にのみ使用してください。
- <4>肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。

### 保管及び取り扱い上の注意

- <1>直射日光のあたらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- <2>小児の手の届かないところに保管してください。
- <3>他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- <4>使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- <5>使用済みの容器は、トイレに流さないでください。
- <6>個包装開封後は、キャップがはずれ薬剤が出てしまうおそれがありますので注意して保管してください。

#### お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

O-T製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

118960-201202